


PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION OU DE DECLARATION DE MALADIES CONTAGIEUSES

MALADIES	EVICTION	MESURES D'HYGIENE
<p>Angine bactérienne (streptocoque) Environ 25 à 40 % des angines de l'enfant. Un test de diagnostic rapide révèle en quelques minutes si l'angine est d'origine virale ou bactérienne.</p>	<p>2 jours après le début du traitement ATB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Lavage de nez avec mouchoir papier à usage unique jeté dans une poubelle fermée d'un couvercle - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D'AFFICHAGE</p>
<p>Bronchiolite Origine virale</p>	<p>2 jours</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Lavage de nez avec mouchoir papier à usage unique jeté dans une poubelle fermée d'un couvercle - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D'AFFICHAGE</p>
<p>Conjonctivite Virale ou bactérienne</p>	<p>Traiter au sérum physiologique pendant 48 heures et si persistance il est demandé de consulter un médecin pour instaurer un traitement antibiotique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Désinfection de chaque œil avec une compresse différente allant de l'angle externe à l'angle interne - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D'AFFICHAGE</p>


Docteur DOUAY Céline
 Médecin de PMI
 N°RPPS 810001616407

<p>Gastro-entérite</p>	<p>Si vomissements ou à partir de 3 selles liquides dans la journée Retour possible après 2 selles moulées</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Utiliser des gants jetables - Jeter les couches dans un sac hermétique fermé et jeter dans le local poubelle - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) - Faire boire de la solution de réhydratation orale à volonté entre les biberons - Peser l'enfant - Surveiller si sang dans les selles <p>INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Impétigo Origine bactérienne</p>	<p>72 heures après le début de l'ATB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Utiliser des gants jetables - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p>INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Varicelle Origine virale (Pour information : période de contagiosité 14 jours avant et 7 jours après le début de l'éruption)</p>	<p>Pas de contre-indication si vésicules croûteuses Eviction selon l'état général de l'enfant</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Utiliser des gants jetables - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p>INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Scarlatine Origine bactérienne Incubation 24 heures – fièvre ↑ angine rouge – éruption thorax</p>	<p>2 jours après le début du traitement ATB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p>INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>

<p>Rougeole</p>	<p>5 jours après le début de l'éruption cutanée</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Syndrome pieds / mains / bouche</p>	<p>2 jours d'éviction ou certificat de non contre-indication pour le retour en crèche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage des mains - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Teigne</p>	<p>Si absence de traitement : certificat de non contre-indication pour le retour en crèche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Désinfecter le linge 60°C en contact de l'enfant - Utiliser des gants jetables - Nettoyage des jouets <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Poux</p>	<p>Eviction tant qu'il y a des poux ou des lentes dans les cheveux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laver le linge en contact avec l'enfant à 60°C, sinon l'enfermer dans un sac pendant une semaine - Utiliser des gants jetables - Lavage des surfaces, des jouets et autres objets en contact avec les enfants (tapis, lit, draps...) - Traiter les cheveux avec une lotion à base de Diméticone le 1^{er} jour et le 8eme jour <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>
<p>Gale</p>	<p>Si absence de traitement : certificat de non contre-indication pour le retour en crèche 3 jours d'éviction après le traitement effectif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Désinfecter le linge 60°C en contact de l'enfant - Utiliser des gants jetables <p style="text-align: center;">INFORMER LES PARENTS PAR VOIE D’AFFICHAGE</p>

Docteur DOUAY Céline
Médecin de PMI
N°RPPS 810001616407

